

タムチンキ パウダースプレー

第2類医薬品

特徴

1. ジュクジュク水虫に適した水虫薬!

サラサラパウダーがジュクジュクした患部を乾燥させて、主成分クロトリマゾールの働きで水虫を治します

2. 水虫のかゆみをしっかり抑える!

2.5%のかゆみ止め成分リドカインと、抗炎症成分グリチルリチン酸二カリウムの働きで、水虫によるかゆみをしっかり抑えます

3. 手が汚れないスプレータイプ!

スプレータイプなので手が汚れません

販売名: **タムチンキパウダースプレーC**
Powder Medicine for Athlete's Foot

水虫・たむし用薬

(効能・効果)

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

(用法・用量)

1日数回、患部に適量噴射してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと
- (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) **使用前によく振ること**
- (6) 患部まで約3cmの距離で噴射すること
- (7) **凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと**

●用法・用量を厳守すること

(成分・分量) 100g中

成分	分量
クロトリマゾール	100mg
リドカイン	250mg
グリチルリチン酸二カリウム	100mg
クロルヘキシジン塩酸塩	20mg
酸化亜鉛	1000mg

添加物として、イソプロパノール、タルク、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸Mg、LPGを含有する

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及び缶底に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤または本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 乳幼児
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が顔面または広範囲の人
 - (5) 患部が化膿している人
 - (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれなどの症状がある場合は、湿疹など他の原因による場合が多い)
- 末梢血行障害がある、又はあると思われる人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、疼痛、ただれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる

3. 2週間くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

あったらいいな
をカタチにする
小林製薬

(保管および取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにキャップをしっかりとめて保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 火気に近づけないこと
- 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと
 - 本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床などにつかないようにすること

ガス抜きキャップ付き

中身を完全に使い切ってから、火気や人気がない戸外で行ってください。

<ガス抜きの注意事項>

本品のキャップ以外使用しないでください。

<ガス抜きの方法>



① キャップを外し、さらにキャップ上部のカバーを外します。キャップの下に新聞紙などを敷きカバーを外した口を上にして平らで安定する場所に置きます。



② 図のようにカバーを外した口にノズルを溝に通しながらボタン部分全体を入れて、缶を奥までしっかり押し込んでください。ガスが連続噴射されます。ガスの噴射音が消えるまで行ってください。

③ 噴射音が完全に消えてから、市町村などで定められた方法により廃棄してください。

※中身を大量に残した場合の排出方法は発売元にお問い合わせください。

火気と高温に注意

- 捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

高圧ガス: LPG
火気厳禁 引火性固体 危険等級Ⅲ
イソプロパノール含有物

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN