

錠剤



原寸大

くり返す
排尿時の痛み
残尿感に

漢方

ボーコレン

菌を押し流し、痛みをおさえる

〈パウチタイプ〉

第2類医薬品

体力中等度のものの次の諸症：
排尿痛、残尿感、頻尿、尿のにごり



小林製薬

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(箱側面及びパウチ裏面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

押して開ける

漢方製剤 第2類医薬品

販売名:ボーコレン
Urination Pain Medicine

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人:むくみ
- (6) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること:下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度のものの次の諸症：排尿痛、残尿感、頻尿、尿のにごり

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(12錠)中 五淋散料エキス…2.55g

[ブクリョウ 3.0g、トウキ・オウゴン・カンゾウ・ジオウ・タクシャ・モクツウ・カッセキ・シャゼンシ各1.5g、シャクヤク・サンシシ各1.0g より抽出]

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

MADE IN JAPAN

漢方

ボーコレン

くり返す 排尿時の 痛み 残尿感に

菌を押し流し、痛みをおさえる

特徴

- 11種類の生薬からなる漢方処方「五淋散」です。
- 膀胱や尿道などに違和感を感じる方の、排尿痛、残尿感、頻尿などのつらい症状を徐々に緩和していきます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

第2類医薬品

あったら
いいな

をカタチにする

 小林製薬

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします。

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

10196043