



カサつく肌のかゆみ治療薬

メンソレータム[®]
AD

かゆみに
効く!



しっとりとした使い心地

第2類医薬品

税 控除 対象

3つのかゆみ止め成分配合で、
乾燥等によるかゆみを素早く抑えます。


クロタミトン

リドカイン

ジフェンヒドラミン

温感神経に働き、かゆみ神経の働きをかゆみを軽減します。弱めます。

かゆみの原因であるヒスタミンの作用を止めます。



かゆみをしっかり抑えて
かゆみのおきにくい肌へ!
抗炎症成分、ビタミンE誘導体配合

保湿基剤(グリセリン)配合で、カサつく肌もなめらかに。

■成分(1g中) クロタミトン…50mg、リドカイン…20mg、ジフェンヒドラミン…10mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)…5mg、グリチルレチン酸…2mg ●添加物として、流動パラフィン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、尿素、ステアリン酸グリセリン、2,2',2"-ニトリロトリエタノール(トリエタノールアミン)、パルミチン酸イソプロピル、セトマクロゴール、乳酸Na、カルボキシビニルポリマー、セタノール、コレステロール、ℓ-メントール、塩化Mgを含有する。
ステロイド成分を配合していません。※防腐剤(パラベン等)を配合しておりません。

この外箱の説明書きを必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

■使用上の注意 ●してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1. 次の部位には使用しないこと。(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等 (2) 傷のあるところ

●相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やかぶれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。


■保管及び取り扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

開封口

① 押してあける



② 解体できます



Anti-Itch Cream

■販売名:メンソレータム®ADクリームm 第2類医薬品

効能・効果

かゆみ、皮フ炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、しっしん、ただれ、あせも、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部にぬってください。

<用法・用量に関連する注意> (1) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 外用にのみ使用すること。

こんなかゆみに…



就寝中のムズムズ
がまんできかないかゆみ



下着のしめつけ、
こすれで起こる皮フ炎



かけばかくほど
イライラするかゆみ

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク

東京：03-5442-6020

大阪：06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

0120-149-931