

ロート製薬

和漢錠

わかんせん

錠剤タイプ



原寸大

(15才以上)

ガチラック

独活葛根湯

どっかつかつこんとう

固まつた首筋  
寝ちがえ・肩こりに

痛くて  
動かない…



〈販売名〉ガチラック

PCで  
肩こり…



寝ちがえて動かせない首筋や、長時間の  
パソコン作業などでガチガチに固まつた肩を、  
「血流改善」と「鎮痛」作用でラクにします。

【効能・効果】体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症:  
肩こり、四十肩、五十肩、寝ちがえ

血流を  
改善して  
ほぐす

第2類医薬品

切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

漢方製剤

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: 排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**[用法・用量]**次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
15才未満	服用しないこと

※食間とは、食後2~3時間を指す。

<用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守すること。

**アンケート  
ご協力のお願い**



アクセス番号をお控えの上、携帯電話またはパソコンでアクセスしてください。  
<https://jp.rohto.com/qrank/>  
【アクセス番号】0060

副作用被害救済制度の問合せ先：0120-149-931

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク：06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)