

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。〈目薬〉



販売名:ロートソフトワン点眼液 第3類医薬品

## 特 長

⚠ 開栓後、10日を過ぎたものは使用しないでください。

- 防腐剤\*フリー。清涼化剤(メントール)フリーで、やさしくて安心感のあるさし心地の目薬です。 \*防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。
  - すべてのコンタクトレンズを装着したまま使用できます。また、コンタクトレンズをはずした後にもご使用いただけます。
- ソフト      ハード  
O<sub>2</sub>      使い捨て
- 涙液に近い性質を持った人工涙液で、涙液不足に伴う目の乾き(ドライアイ)、異物感などの不快な症状を改善します。
  - コンタクトレンズ着用時の不快感、目の疲れ、目のかすみ、目の乾きなどの症状を改善します。
  - フリーアングルノズル®採用で自由な角度で点眼できます。



## キャップの開閉方法

容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。容器の中央部分だけを持って開閉すると薬液がとびだしてもれることがあります。

### キャップの開け方

キャップを手前にひねってください。



### キャップの閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。



## △ 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人：はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人：緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い
- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 目のかすみが改善されない場合
  - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

### — 用法・用量に関連する注意 —

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- 点眼用のみ使用してください。
- コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。
- 開栓後、10日を過ぎたものは使用しないでください。



## 効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 成 分

有効成分 塩化カリウム…0.1%、塩化ナトリウム…0.4%  
添加物 ホウ酸、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用し、開栓後、10日を過ぎたものは使用しないでください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- 容器に他の物を入れて使用しないでください。

### お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

**ROHTO**

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

401521501