

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



メンソレータム®  
カユピット®<sub>b</sub>

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

顔のかゆみが起こる原因の一つは、肌のバリア機能が弱まり、外部刺激を受けやすくなっているから。

「メンソレータム®カユピット®<sub>b</sub>」は、4つの有効成分がかゆみ・湿疹などの症状にしっかり効く治療薬です。きちんと治すことで、バリア機能の正常化につながります。

## 4つの有効成分配合 ~かゆみにすばやく効く~

ジフェンヒドラミン塩酸塩

かゆみの原因に作用

アラントイン

赤み・炎症を抑え、皮膚の修復促進

リドカイン

かゆみを鎮める

グリチルリチン酸二カリウム

赤み・炎症を抑える



かゆみ・赤みなどのトラブル肌

イメージ図

## デリケートな顔に7つのこだわり処方

デリケートな顔のかゆみだからこそ、患部につかやすい処方設計。マイクロワセリンクリームが外部刺激から肌を守ります。

- ✓非ステロイド
- ✓ノンメントール
- ✓弱酸性
- ✓無香料
- ✓尿素無配合
- ✓アルコールフリー
- ✓無着色



ここもポイント

目のまわり、口のまわりにも使える

メイクがヨレにくい

(目に入らないよう、ご使用ください)



高密着

ワセリンベース処方



花粉かぶれ  
マスクかぶれにも

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**効能・効果** かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、じんましん、ただれ、あせも、虫さされ、しもやけ

**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

#### 成分・作用(1g中)

有効成分	配合量	作用
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	かゆみの原因に働きます。(抗ヒスタミン作用)
リドカイン	5mg	かゆみをすばやく鎮めます。(局所麻酔作用)
アラントイン	2mg	赤み・炎症を抑え、皮ふの修復を促します。(消炎・修復作用)
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	赤み・炎症をおさえます。(消炎作用)

添加物として、ワセリン、グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンアラキルエーテル、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジメチルポリシロキサン、クエン酸、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、パラベン、水添大豆リン脂質、エドト酸Na、クエン酸Naを含有する。

#### 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

#### お問い合わせ先: ロート製薬お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

**ROHTO**

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1