使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目のつかれ・かすみに

アイリスネオ〈ソフト〉〈目薬〉

第3類医薬品

◆アイリスネオ〈ソフト〉は、日常生活の中で目を酷使して起こる、目のつかれ・かすみに効果的な目薬です。
◆「ネオスチグミンメチル硫酸塩」が目のピント調節機能を改善し、目のつかれをやわらげます。
◆スーッとしたソフトなさし心地です。

使用上の注意

相談すること

❶ 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。
　はげしい目の痛み
(4)次の診断を受けた人。
　緑内障

❷ 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

❸ 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)目のかすみが改善されない場合。
(2) 2 週間位使用しても症状がよくならない場合。

効　能

目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感



用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

［注意］

(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
(4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
(5)点眼用にのみ使用してください。

成　分

成　分	分 量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	目のピントを調節する毛様体筋に作用し、目のつかれ・かすみを改善します。
酢酸*d*-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）	0.05%	末梢血管の血液の流れを改善し、栄養供給を促進して目のつかれをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB_6）	0.1%	弱った目の組織代謝を活発にし、目のつかれをやわらげます。
タウリン	1.0%	細胞代謝を促進し、目に栄養を与え、目のつかれをやわらげます。
L-アスパラギン酸カリウム	1.0%	目の組織呼吸を促進し、目のつかれをやわらげます。

添加物：*l*-メントール、リュウノウ、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、クエン酸、クエン酸Na、ホウ酸、pH調節剤、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、エタノール

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
(4)他の人と共用しないでください。
(5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。（容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります）
(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。（品質保持のため）
(7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。

目薬をさす時の注意と正しいさし方

注　意

●容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しいさし方

●手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
●やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
連絡先　大正製薬株式会社　お客様119番室
電　話　03-3985-1800
受付時間　8:30～21:00（土、日、祝日を除く）

発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
http://www.taisho.co.jp

製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山県富山市荒川1丁目3番27号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120−149−931（フリーダイヤル）

KY17-03