

ご使用に際して、この説明  
文を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう  
大切に保管してください。

# 植物性の便秘薬 サトラックス

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医  
薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬(下剤)

2. 授乳中の方は本剤を服用しない  
か、本剤を服用する場合は授乳を  
避けてください

3. 大量に服用しないでください



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又  
は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状  
を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場  
合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、本品  
を持って医師、薬剤師又は登録  
販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、 吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることが  
ありますので、このような症状の持続  
又は増強が見られた場合には、服用  
を中止し、本品を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者にご相談ください  
下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくな  
らない場合は服用を中止し、本品  
を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者にご相談ください

## 成分・分量と働き 16g中

成 分	分 量	働 き
プラントゴ・ オバタ種子	8.672g	腸内で水分を吸収して 膨潤し、適度な硬さの 便をつくります。また、 腸のぜん動をうながし て自然に近いお通じを 誘います。
センナ実	1.984g	衰えた腸の運動を高め、 排便をうながします。

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、流動  
パラフィン、パラフィン、香料(L-メントールを含  
む)、三二酸化鉄、酸化鉄を含有します。

**効 能** ●便秘 ●便秘に伴う次の諸症状の  
緩和：吹出物、肌あれ、頭重、のぼせ、腹部膨  
満、腸内異常發酵、食欲不振(食欲減退)、痔

**用法・用量** 下記の1回服用量をなる  
べく空腹時にコップ一杯の水又は白湯  
でかまずに服用します。服用間隔は  
4時間以上おいてください。ただし、  
初回は最小量を用い、便通の具合や  
状態をみながら少しずつ増加または  
減量してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	4~8g	2回を限度とします
15才未満	服用しないでください	

### 用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して  
ください。
- (2) かならずコップ一杯(約180mL)  
の水又は白湯でかまずに服用して  
ください。

### 取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤は、吸湿性がありますので、服用後はフタをしっかりしめて保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用救済制度 電話 0120-149-931

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

提携 マダウス社<ドイツ> (A)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03-5412-7393  
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

★本品には添付文書はついておりません。外箱の記載文を代用しています。