



キズの殺菌消毒に

マキロン<sup>®</sup>S

皮膚の修復成分配合

殺菌消毒薬

第3類医薬品

外用専用

マキロンS

効能・効果 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、  
創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

成分・分量(100mL中) ベンゼトニウム塩化物・・・0.1g  
アラントイン・・・0.2g クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・0.2g  
添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントール

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社 東京都中央区日本橋3-14-10

お客様相談室 0120-337-336 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)


副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

本品は透明フィルムで包装しています。

使用前にこの説明  
文書を必ずお読み下さい。

使用法：1日数回、患部に噴霧又は  
ガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。

〈使用法に関連する注意〉(1)使用法を厳守  
すること。(2)小児に使用させる場合には、保護者  
の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入ら  
ないように注意すること。万一、目に入った場合には、  
すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い  
場合には、眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ  
使用すること。〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の  
当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手  
の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えない  
こと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)表示の使用期限  
を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は、12カ月  
以内に使用して下さい。(5)持ち運びの際は、キャップ  
が押され液が漏れることがありますので、密封できる  
袋等に入れて下さい。  
アルコールを含むので、しみることがある。

**△使用上の注意**  **相談すること** 1. 次の人は使用  
前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりア  
レルギー症状を起こしたことがある人 (3)患部が  
広範囲の人 (4)深い傷やひどいやけどの人 2. 使用  
後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が  
あるので、直ちに使用を中止し、本品を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚：発疹  
・発赤、かゆみ、はれ 3. 5～6日間使用しても症状が  
よくなる場合は使用を中止し、本品を持って医  
師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

K®登録商標