

使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
●長期連用しないで下さい。

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人(2)高齢者(3)むくみのある人(4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。
偽アルドステロン症、ミオパチー(手こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。)
3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法・用量 成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用して下さい。

●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
●用法・用量を厳守して下さい。

成分 —1本(50mL)中— ()内は
原生薬換算値

エンメイソウエキス30mg(201mg)
ウコン流エキス0.3mL(300mg)
カンゾウ抽出物115mg(1644.5mg)
チョウジチンキ0.126mL(37.8mg)
ゲンチアナチンキ0.376mL(112.8mg)
ニンジン流エキス0.5mL(500mg)
オウレンチンキ0.792mL(237.6mg)
ソウジュツ流エキス1.2mL(1200mg)
ケイヒチンキ0.25mL(75mg)
カルニチン塩化物 120mg

添加物：白糖、ハチミツ、アルコール、プロピレングリコール、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、l-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料
(アルコール 1.5 mL以下)

●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

生薬配合
胃腸薬

第2類医薬品

ソルマック

EX2

ウコン・ニンジン配合!



販売名：ソルマックEX2

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

<http://www.taiho.co.jp/>

効能・効果

食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

®:登録商標