


話しながら使える
貼り付くトローチ

咳やたんを
おさえる

ぴたっと

PITAS

—ピタス—



実物大



移動中



会議中



鑑賞中

販売名:
ピタスせきトローチ

セルフメディケーション

第2類医薬品

税 控除 対象

第2類医薬品

販売名:ピタスせきトローチ

特徴●口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらい、つらい咳を抑えます。

使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書きを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果] せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

[用法・用量] 次の量を口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上
15歳未満	使用しないこと。		

<用法・用量に関連する注意> (1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。

[成分] 6個(1日使用量)中

成分	含量
フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、L-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料


製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

<https://www.taiho.co.jp/>



副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

S220204