



医薬品

秒速+まぢぶせ  
ワッダウ

速効性・殺菌力

ワッダウ

第2類医薬品

スプレーしてまぢぶせ駆除。

スプレーしてまぢぶせ

スプレーしてまぢぶせ

お子様・ペットが  
いるご家庭にお!

スプレーしてまぢぶせ

## 秒速ノックダウン

有効成分イミプロトリンの効果で、ゴキブリに直接スプレーして駆除。



## まちぶせ駆除

通り道にスプレーしておくだけで残効成分メトキサジアゾン+誘引成分オレンジオイルの見えない罠でゴキブリを駆除。パウダー配合\*なので効きめ長持ち!



\*使用前に缶をよく振ってからお使いください。

【販売名】 ゴキジェットD1

【効能・効果】 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除

【有効成分】 450mL中イミプロトリン0.5g(ブラルとして1.0g)、メトキサジアゾン0.41g

【その他の成分】 無水ケイ酸、オレンジ油、無水エタノール、ミリスチン酸イソプロピル、1号灯油、LPG、DME

## 第2類医薬品

第一石油類 危険等級Ⅱ  
ケロシン105mL「火気厳禁」

## アース製薬株式会社 JSK

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様から  
お気づきを  
頂く窓口

ムシコロリ  
**0120-81-6456**  
受付時間9:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)



必ず  
換気

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス:LPガス/DME

Made in Japan

## 便利なすき間用ノズル付

### 使用時

ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。



### 使用后

缶のフチに留めてください。



### 使用方法

●使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上を持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください(イラスト)。

●噴射レバーを引き、小型の害虫(チャバネゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ及びマダニ)には約1~2

秒、大型の害虫(クロゴキブリ等)には約6~8秒直接噴射してください。また、害虫の逃げ込んだすき間には約1~2秒噴射してください。すき間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。まちぶせ駆除する場合は、害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所に、約20cmの距離から帯状にじゅうぶん濡れる程度噴射塗布してください。使用量の目安:1mあたり45~60秒程度(幅10cm、長さ1mの塗布面に4.5~6秒程度)

●冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤とオキサジアゾール系の薬剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●逆さまでスプレーしないでください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。●変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。●換気してください。

●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。●缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

●本品は使い切ってから捨ててください。●捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、黒色のスプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差し込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押下げると最後まで噴射できます。

※ガスの抜き方 噴射レバーを引いたまま側面の孔につまようじ等を差し込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意してください。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬の左上記載の窓口にお問い合わせください。

●人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●40秒以上連続噴射しないでください。

●冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤とオキサジアゾール系の薬剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●逆さまでスプレーしないでください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。●変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。●換気してください。

●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。●缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

●本品は使い切ってから捨ててください。●捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、黒色のスプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差し込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押下げると最後まで噴射できます。

※ガスの抜き方 噴射レバーを引いたまま側面の孔につまようじ等を差し込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意してください。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬の左上記載の窓口にお問い合わせください。

●人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●40秒以上連続噴射しないでください。

●冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤とオキサジアゾール系の薬剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。

●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●逆さまでスプレーしないでください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、観賞エビ、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、衣類・寝具、家電にかからないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。●変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。●換気してください。

●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。●缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

●本品は使い切ってから捨ててください。●捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、黒色のスプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差し込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押下げると最後まで噴射できます。

※ガスの抜き方 噴射レバーを引いたまま側面の孔につまようじ等を差し込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意してください。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬の左上記載の窓口にお問い合わせください。

●人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●40秒以上連続噴射しないでください。

●冷蔵庫の裏などのすき間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(すき間には約1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤とオキサジアゾール系の薬剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師または薬剤師に相談してください。



折り取る  
(パキッと音がするまで)

