

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

湿疹・皮膚炎・かぶれに

第②類医薬品

外用副腎皮質ホルモン剤

# ロコイダン<sup>®</sup>クリーム

## LOCOIDAN<sup>®</sup> cream

### 特 徴

- ロコイダンクリームは、抗炎症作用をもつヒドロコルチゾン酪酸エステルを主成分とする外用副腎皮質ホルモン剤で、皮膚の炎症を抑え、腫れ、かゆみなどに効果があります。
- ロコイダンクリームは、湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、あせもに効果があります。

### ⚠️ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください  
水痘(みずぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

#### 👤 相談すること


1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 患部が広範囲の人  
(5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〔チューブの開け方〕

キャップを逆さにして、キャップの突起部をチューブ先端部に強く押しつけて開口してください。



(裏面につづきます)



## 効 能

湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、あせも

## 用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は、外用にのみ使用してください。

## 成分・分量 本品100g中

ヒドロコルチゾン酪酸エステル …………… 50mg

添加物として、無水クエン酸、クエン酸ナトリウム水和物、パラベン、セタノール、流動パラフィン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ワセリンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤の使用期限は、外箱及びチューブに記載してありますので、使用期限のすぎた商品は使用しないでください。
- (5)この文書は、本剤をご使用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、チューブと一緒に箱に入れて保管してください。



副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**クラシエ 薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **鳥居 薬品株式会社**  
東京都中央区日本橋本町3-4-1 (〒103-8439)

\* 提 携 **LEO Pharma A/S**