

【成分・分量】100g中
 インドメタシン…1,000mg
 0-メントール……3,000mg
 添加物:ジイソプロパノール
 アミン、エデト酸Na水和物、
 エタノール、ベンジルアルコ
 ール、カルボキシビニルポリ
 マー、チオ硫酸Na水和物、ヒ
 プロメロース、キサンタンガ
 ム、1,3-ブチレングリコ
 ール、ハアセチルしょ糖、N-メ
 チル-2-ピロリドン

【保管及び取扱い上の注意】
 (1)直射日光の当たらない湿
 気の少ない涼しい所に密栓
 して保管してください。(2)小
 児の手のとどかない所に保
 管してください。(3)他の容
 器に入れかえないでくださ
 い。(誤用の原因になったり品
 質が変わる)(4)メガネ、時計、
 アクセサリー等の金属類、化
 織の衣類、プラスチック類、
 床や家具などの塗装面等に
 付着すると変質することが
 ありますので、付着しないよ
 う注意してください。(5)火
 気に近づけないでください。
 (6)本剤のついた手で、目な
 どの粘膜にふれないでくださ
 い。(7)使用期限(外箱及び
 チューブに記載)を過ぎた
 製品は使用しないでくださ
 い。

ツライ痛み^に直接浸透

インドメタシン
 経皮吸収型
 消炎鎮痛剤 **1%**

清涼感のある **ゲル**
 タイプ



肩こりの痛み
 関節痛

筋肉痛
 腰痛

スピーダム1%ゲル

第2類医薬品

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛
 み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手
 ・手首の痛み)、肘の痛み(テニ
 ス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を
 患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)11歳以上の小児に使用さ
 せる場合には保護者の指導監
 督のもとに使用させてくださ
 い。(2)11歳未満の小児には
 使用させないでください。(3)
 目に入らないよう注意してく
 ださい。万一、目に入った場
 合には、すぐに水またはぬる
 ま湯で洗ってください。なお、
 症状が重い場合には、眼科医
 の診療を受けてください。(4)
 外用にのみ使用してください。
 (5)1週間当たり50gを超え
 て使用しないでください。(6)
 薬剤塗擦後の患部をラップ
 フィルムなどの通気性の悪
 いもので覆わないでくださ
 い。(7)定められた用法・用
 量をお守りください。

発売元

東光クリエート株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
 東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆

お客様相談窓口 03-3855-0101

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

ここから
 開けてください

第2類医薬品

販売名 スピーダム1%ゲル

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
 また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
 副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください
 - 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等または化膿している患部。
- 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5~6日間使用しても症状がよくなる
 ない場合は使用を中止し、この文書
 を持って医師、薬剤師または登録販
 売者に相談してください