

【成分・分量】100g中

インドメタシン…… 1,000mg

2-メントール…… 3,000mg

添加物：ポリオキシエチレン

硬化ヒマシ油、イソプロパノール、

エドト酸Na水和物、オキシ

ベンゾン、ミリスチン酸イソ

プロピル、ベンジルアルコール、

ヒドロキシプロピルセルロース、

グリセリン、チオ硫酸Na水和物、

1,3-ブチレングリコール

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の

少ない涼しい所に密栓して保管し

てください。(2)小児の手のとど

かない所に保管してください。(3)

他の容器に入れかえないでくだ

さい。(誤用の原因になったり品質

が変わる)(4)メガネ、時計、アク

セサリー等の金属類、化繊の衣

類、プラスチック類、床や家具な

どの塗装面等に付着すると変質

することがありますので、付着し

ないよう注意してください。(5)火

気に近づけないでください。(6)使

用期限(外箱及び容器に記載)を

過ぎた製品は使用しないでくだ

さい。

ツライ痛みに直接浸透

# インドメタシン 1%

経皮吸収型消炎鎮痛剤

広範囲に塗りやすい **液**タイプ



肩こりの痛み

関節痛

筋肉痛

腰痛

スピーダム1%液

第2類医薬品

【効能・効果】

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、

腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首

の痛み)、肘の痛み(テニス肘な

ど)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患

部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)11歳以上の小児に使用させる

場合には保護者の指導監督のもと

に使用させてください。(2)11歳

未満の小児には使用させないで

ください。(3)目に入らないよう注

意してください。万一、目に入った

場合には、すぐに水またはぬるま

湯で洗ってください。なお、症状が

重い場合には、眼科医の診療を受

けてください。(4)外用にのみ使用

してください。(5)1週間当たり50mL

を超えて使用しないでください。

(6)薬剤塗布後の患部をラップフ

ィルムなどの通気性の悪いもので

覆わないでください。(7)定めら

れた用法・用量をお守りください。

発売元

東光クリエート株式会社

東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆

お客様相談窓口 03-3855-0101

ここから  
開けてください

第2類医薬品

販売名 スピーダム1%液

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起  
りやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状  
を起こしたことがある人。

(2)ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

(3)みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者  
に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦または妊娠していると思われる人。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことが  
ある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能  
性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持

って医師、薬剤師または登録販売者に相談してくだ

さい

| 関係部位 | 症 状                           |
|------|-------------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、<br>熱感、乾燥感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は  
使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師ま

たは登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931