

第2類医薬品



眠くなる成分を含まない

●感冒の初期
●頭痛 ●鼻かぜ ●鼻炎

葛根湯 内服液

第2類医薬品

かぜのひきはじめに
葛根湯エキス製剤



●感冒の初期
●頭痛 ●鼻かぜ ●鼻炎

葛根湯
内服液

かぜのひきはじめに
葛根湯エキス製剤

1日分

第2類医薬品

押してあける

服用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

本剤は本質的に沈殿物を含んでおりますので、よく振って
から服用してください。

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

販売名:葛根湯内服液NX

【成分・分量】1日量3本(90mL)中

葛根湯エキス……………4310mg
〔カクコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、
シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0g〕
より製したエキス
添加物として、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、アセスルファムK、スクラロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン脂肪酸エステル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、カラメル、プロピレングリコール、バニリン、香料を含有する。

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(30mL)、1日3回食間によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)15歳未満の小児には服用させないでください。
- (3)本剤は1回1本の服用で飲みきり、飲み残しのないようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元 日本薬剤株式会社
富山市東中野町一丁目1番1号
(お問い合わせ先)電話076-424-2239
〔月~金 9:00~17:00(祝日を除く)〕