ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

2015年10月改訂

B1

第②類医薬品

かゆみ・虫さされに

サリキッスローションⅦ
セブン

鎮痒消炎薬

サリキッスローションⅦの特徴
セブン

・液体タイプで、スーッとここちよい清涼感を与えます。
・首の部分が曲がっていて、塗りにくい患部にもスポンジがピッタリと接し、手を汚さずに塗布できます。
・抗炎症成分(デキサメタゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸)により、虫ささされ等によるはれ・赤みを改善し、かゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン)により、かゆみをすばやく鎮めます。
また、殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)が掻き壊した患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。

使用上の注意

してはいけないこと

〈守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〉

1．次の部位には使用しないでください。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
(2)目の周囲、粘膜等

2．顔面には、広範囲に使用しないでください。

3．長期連用しないでください。

相談すること

1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人

2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症　　状
皮　　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3．5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面も必ずお読みください

効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、皮ふ炎、かぶれ、じんましん、あせも、しもやけ

かゆみ	虫さされ	かぶれ・湿疹	あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量をお守りください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 本剤にはアルコールが含有されているため、塗布した時にしみることがあります。
(5) 本剤のついた手で、目など粘膜にふれないでください。
(6) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
(7) 使用する際は、スポンジ部分をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。(スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。)
また、スポンジ面に薬液をしみ込ませても、強く押し当てたまま塗布しますと、スポンジが破損する原因になりますのでご注意ください。



スポンジ面をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから患部に塗布してください。

※暑い時期など、内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、ご使用前に、キャップを開けて容器を立てたまま、スポンジ部分を数回押してください。

成分・分量

成　　分	含　量 (100mL中)	は　た　ら　き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025 g	炎症を抑え、はれ・赤み等の症状を改善します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、虫さされ等に伴うかゆみや炎症を抑えます。
グリチルレチン酸	0.3 g	炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	患部の雑菌の繁殖を抑え、症状の悪化を防ぎます。
リドカイン	0.5 g	局所麻酔作用により、かゆみをすばやく鎮めます。
dl-カンフル	2.0 g	清涼感を与え、かゆみをすばやく鎮めます。
l-メントール	3.5 g	

添加物：1,3-ブチレングリコール、酒石酸、イソプロパノール、エタノール

保管及び取扱い上の注意

(1) 使用後は、速やかにキャップを十分にしめて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。)
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
(4) 火気に近づけないでください。
(5) 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
(6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
(7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

・お買い求めの販売店
・ジャパンメディック株式会社　お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）9:00～17:00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168