

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

# 第3類医薬品 ネオヨジン<sup>®</sup> うがいぐすり

ネオヨジンうがいぐすりは、口中やのどの有害な細菌に対し短時間で殺菌効果を発揮します。  
口腔内の殺菌・消毒や洗浄に適しており、また、口臭除去作用も有しています。

### 特徴

- ☆広範囲の細菌に殺菌効果を有します。
- ☆短時間で殺菌効果をあらわします。
- ☆メントールやペパーミントの香りが口臭や口内の不快感を除き、また、のどを爽やかにします。
- ☆口内の粘膜を刺激しません。



### 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人  
　　口内のひどいいたれ
- (3) 甲状腺の疾患のある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄  
口臭の除去

### 用法・用量


1回 2～4mL を約60mL の水でうすめて1日数回うがいしてください。

## 〈使用法〉うがいの仕方

### 50mL入りの場合

キャップをはずして容器を逆さに持ち、指でゆっくりと押します。本剤2～4mL(1～2目盛)をコップにとり約60mL(コップ約1/3)の水でうすめ、ていねいにうがいしてください。

### 130mL、300mL入りの場合



1回2～4mLを添付コップの線まで入れて  
コップを傾け液が2～4mL入ったことを確認し  
水(水道水)でうすめて  
コップ約60mLの量にし  
口中が充分うがいでき  
るようていねいに

添付のコップをかたむけて1回2～4mLをコップの底部に刻んだ斜めの目盛り線まで入れて約60mL(目盛線まで)の水でうすめ、ていねいにうがいしてください。

### 〔計量〕



### 〔希釀〕



## 〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、うがい液をはき出せない年齢の小児には使用させないでください。
- 本剤はうがいのみに使用し、内服用としては使用しないでください。
- 本剤はうがいする時にうすめてください。(うすめた液は保存しないでください。)

成分・分量	成 分	1mL中 日局ポビドンヨード 70mg含有
添加物	炭酸水素Na、クエン酸水和物、ヨウ化K、サッカリンNa水和物、エタノール、l-メントール、香料	
性 状	赤褐色の液体で、芳香があり味は甘い	

## 〈成分及び分量に関する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 衣類等に付着すると着色しますのでご注意ください。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても速やかに使用してください。



## 包 装

50mL、130mL、300mL

## お問い合わせ先

お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

岩城製薬株式会社 電話 (03) 6626-6252 受付時間 平日 9:00～17:00

製造販売  
岩城製薬  
株式会社

岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2

A20712