

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

眠気防止薬

カーフェソフト錠[®]

第3類医薬品

カーフェソフト錠は、2錠中におよそコーヒー3杯分に相当するカフェインを含有した眠気防止薬です。
成分のカフェインが精神機能を活発にして、会議中や運転中などの眠気を除去してくれます。

使用上の注意

してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】

- ① 次の人は服用しないでください。
 - (1) 次の症状のある人
胃酸過多
 - (2) 次の診断を受けた人
心臓病、胃潰瘍
- ② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の眠気防止薬
- ③ コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。
- ④ 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸




効能・効果

眠気の除去

用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。


年齢	1回量	服用量
成人(15歳以上)	1~2錠  ~  	1日5錠まで
小児(15歳未満)	× 服用しないこと	

[用法・用量に関連する注意]

- ① 続けて服用する必要がある場合は、4時間以上の間隔をおいてください。
- ② かまずに早めにのみこんでください。(かむと苦味がでます。)

[錠剤の取り出し方]

右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分と働き

1錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
無水カフェイン	93mg	大脳皮質の感覚中枢を興奮させ、精神機能を活発にして眠気を除去します。

[添加物]

サッカリンNa、トウモロコシデンプン、乳糖、バニリン、バレイショデンプン、D-マンニトール、香料、アセチルグリセリン脂肪酸エステル、カルメロースCa、酒石酸水素K、ジオクチルソジウムスルフォサクシネート、ステアリン酸Ca、セルロース、ポビドン、マクロゴール、リン酸水素Ca

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「hhcホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00)



製品の内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元

alfresa アルフレッサファーマ株式会社
大阪府中央区石町二丁目2番9号

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU15785-6JD