

水なしで  
かんで服用

いちご  
風味

◀ ここからお切りください。開封後は、チャックを端から押さえて閉めてください ▶

大木製薬の

ビタミン  
A

ビタミン  
B6

ビタミン  
C

ビタミン  
D2

ビタミン  
E

パントテン酸Ca 配合

パパーゼリー5

家族みんなのゼリー状ビタミン剤



偏食がち



発熱して、  
体がだるそう



発育期

かんで服用

子供(1歳~14歳)・・・1日1粒  
成人(15歳以上)・・・1日2粒

第2類医薬品

家族みんなのゼリー状ビタミン剤  
大木製薬の**パーゼリー5**

いちご風味  
水なしで、かんで服用

◀ 切り口 開封後はチャックを端から押さえて閉めてください。 切り口 ▶

パーゼリー5は、ビタミンA、B<sub>6</sub>、C、D<sub>2</sub>、Eとパントテン酸カルシウムを配合した、かんで容易に服用していただけるいちご風味の甘いゼリー状ビタミン剤です。お子さまが、かぜなどの発熱や下痢などでぐったりしているときや、食事が進まないときなどの栄養補給に適しています。

販売名 **パーゼリー5** 第2類医薬品

水なしで、かんで服用

#### 【使用上の注意】

**〈してはいけないこと〉** [守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります。] 次の人は服用しないでください。●本剤は、乳児(1歳未満)に服用させないでください。

**〈相談すること〉** 1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人、又は妊娠を希望する人。(妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に、先天異常の割合が上昇したとの報告があります。) 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●皮膚…発疹・発赤、かゆみ 消化器…吐き気・嘔吐、下痢 3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この袋を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【用法・用量についての注意】** (1) 乳児(1歳未満)に服用させないでください。(2) 必ずかんで服用してください。(3) 定められた用法・用量をお守りください。(4) 幼児(1歳～6歳)に服用させる場合には、のどにつかえないようよく注意してください。(5) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【保管および取扱い上の注意】** (1) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない所にチャックを閉じて保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限の過ぎたものは服用しないでください。(5) 本剤はゼリータイプのため、保管状況によっては変色やひび割れが発生することがありますが、医薬品の本質には問題ありませんので、そのまま服用ください。

#### 【効能・効果】

幼小児の発育期・偏食児・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

#### 【用法・用量】

●成人(15歳以上)2粒、小児(1歳～14歳)1粒を1日1回、随時服用してください。1歳未満に服用しないこと。

製造販売元

 **大木製薬株式会社**  
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

お客様相談室 ☎03-3256-5051  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)



ママが笑顔になれるサイト

**Smile tree**  
スマイル ツリー



#### 【成分・分量】 1日量(2粒中)

ビタミンA油 …………… 4mg  
(ビタミンA 4,000国際単位)  
ビタミンD<sub>2</sub> …………… 0.01mg  
ビタミンE酢酸エステル …………… 5mg  
ビタミンB<sub>6</sub> …………… 1mg  
ビタミンC …………… 40mg  
パントテン酸カルシウム …………… 6mg  
添加物として、水アメ、白糖、カンテン、ペクチン、赤色106号、香料、その他2成分を含有する。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931