

生薬と洋薬を配合したかぜ薬

改源 カイゲン

第②類医薬品

特 徴

- かぜのひきはじめののどの痛みや発熱、頭痛などの症状に効くかぜ薬です。
- かぜの諸症状に効く洋薬成分に加えて、3種類の生薬成分（カンゾウ末、ケイヒ末、ショウキョウ末）が自己治癒力を高め、体の回復を助けます。
- 眠くなったり、口が渇いたり、尿が出にくくなる成分（抗ヒスタミン剤）や便秘を起こしやすい成分（ジヒドロコデインリン酸塩）が入っていない非ピリン系のかぜ薬です。
- お子様から大人まで家族みなさんで服用いただけます。
- 改源は粉末のお薬で、服用しやすいように味や香りを工夫しています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
* 薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量


次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に茶湯又は湯水で服用してください。

年 齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	7才以上 ～11才未満	3才以上 ～7才未満	1才以上 ～3才未満	1才未満
1回量	1包	2 / 3包	1 / 2包	1 / 3包	1 / 4包	服用させないで ください


<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

服用の際は、粉薬をこぼさないようご注意ください。



1 包み紙を広げます。



2 四角又は三角になるように折り目をつけ、粉薬を中央に寄せます。



3 茶湯又は湯水を口に含み、服用してください。

成分と作用

3包(2.1g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	作 用	
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。	
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	せきをしずめ、のどを楽にします。	
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。	
カンゾウ末	200mg	せきをしずめ、たんを出しやすくします。	これらの生薬成分は、自己治癒力を高め、体の回復を助けます。
ケイヒ末	200mg	頭痛をやわらげ、熱を下げます。	
ショウキョウ末	100mg	せきをしずめます。	
○添加物としてアマチャ末、ℓ-メントール、d-ボルネオール、チョウジ油、バニリン、香料、無水リン酸水素カルシウムを含有します。			

<かぜを早く治すために>

- 暖かくしてよく眠り、身体を十分に休めましょう。
- 消化が良く栄養のある食事と水分の補給に心がけましょう。
- 酒・タバコは止めましょう。
- 部屋が乾燥しないよう気をくばりましょう。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)1包を分割し服用した残りは、包み紙をもとどおりに折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
大入包装(60包)に添付している袋は携帯用としてお使いください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
 カイゲンファーマ株式会社「お客様相談室」電話 06-6202-8911
 受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）