

✂ 切り取り線

Kracie

漢方セラピー 便秘を改善したい方に



# ワカ末漢方便秘薬

マツカンポウベンピヤク

T-43

## 〈効能〉

体力中等度なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

## 〈用法・用量〉

1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	2回
15才未満7才以上	2錠	
7才未満5才以上	1錠	
5才未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 〈成分〉

成人1日の服用量6錠(1錠300mg)中

調胃承気湯エキス粉末…1,100mg

(ダイオウ2.5g、カンゾウ1.0g、無水ボウショウ0.5gより抽出。)

添加物として、アルファー化デンプン、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、セルロースを含有する。

## 〈成分に関連する注意〉

- (1) 本剤に含まれるダイオウにより、尿が橙色ないし赤色になることがあります。
- (2) 本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

## 〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

**クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

製造販売元

**クラシエ 製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先☎0120-149-931

✂ 切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

**第2類医薬品**

チャック

漢方製剤

**ワカ末漢方便秘薬錠**

マツカンポウベンピヤク

△ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人  
(5) 高齢者  
(6) 次の症状のある人 むくみ  
(7) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください