



家庭の常備薬

# キンカン®

外用鎮痒鎮痛消炎剤

肩こり  
腰痛  
打撲  
ねんざ

虫さされ  
かゆみに



第2類医薬品

OPEN

販売名

# キンカン®

外用鎮痒鎮痛消炎剤

**第2類医薬品**



虫さされ・かゆみ



肩こり・腰痛  
打撲・ねんざ

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## ▲ ■使用上の注意■

### ⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜等 (2) かぶれ、傷口
2. かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けしないでください。



### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人 (4) 皮膚の特に弱い人や乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状                   |
|------|-----------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感 |

3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能又は効果 ■ 虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

■ 用法及び用量 ■ 1日数回、患部に適量を塗布してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

◆ 使用方法 ● スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませます。● 「塗ってはよく乾かし」を複数回繰り返してください。

■ 成分及び分量 ■ (100mL中) アンモニア水 21.3mL、*l*-メントール 1.97g、*d*-カンフル 2.41g、サリチル酸 0.57g、トウガラシチンキ 0.35mL (原生薬量として35mg) 添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてエタノールを含有します。

### ■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し立てて保管してください。(3) 溶剤としてエタノールを含んでいるため、以下の事項に充分注意してください。● 暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。● 車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。● プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。(4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6) 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

瓶は常に立てて置いてください。

### ■ 消費者相談窓口 ■

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL 03-3421-6171 (代表)

受付時間 9:00~16:00 月~金(祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

**火気厳禁**  
**第二石油類**

製造販売元 株式会社金冠堂

〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号