



キンカン®

実寸大

かゆみを
止める!
かきむしりを
防ぐ!



かゆみ止め
パッチα

第3類医薬品

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

発売元

株式会社金冠堂

〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

❌してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

販売名:かゆみ止めパッチα 第3類医薬品

【包装】 (直径3cmの円形)

【効能又は効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法及び用量】 パッチをライナーからはがし、1日数回患部に貼付してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。
- (5) 本剤を同じ所に長時間続けて使用しないでください。

【成分及び分量】 膏体 100g中

ジフェンヒドラミン(かゆみ止め成分)・・・1.0g

イソプロピルメチルフェノール(殺菌成分)・・・1.0g

トコフェロール酢酸エステル(血行促進成分)・・・0.5g

l-メントール(冷涼成分)・・・3.0g

添加物としてスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ハイスポリイソプレンゴム、BHT、流動パラフィン、その他2成分を含有します。※本剤にはステロイドを含んでおりません。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

〈消費者相談窓口〉

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL 03-3421-6171(代表)

受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

©Benesse Corporation/しまじろう

「しまじろう」は(株)ベネッセコーポレーションの登録商標です。

ここを押して
開けてください

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度
☎0120(149)931