

(1枚 7cm×10cm)

Kowa



VANTELIN KOWA


バンテリン

パットEX

ツライ痛みにはジカに効く!

肩こり痛

腰痛



トリプル鎮痛処方

インドメタジン

アルニカチンキ

l-メントール

TIAAS[®] 製剤
(薄型含水貼付剤)

セルフメディケーション
税 控除 対象

第2類医薬品

この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

開け口

TIAAS®製剤の
詳しい情報はコチラ



外用鎮痛消炎薬(貼付剤) 第2類医薬品

バンテリン[®]パットEX

(1枚 7cm×10cm)

△使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■成分・分量(膏体100g中)

成分・分量	働き
インドメタシン1.0g	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉や関節の痛みをとります。
アルニカチンキ1mL (アルニカとして0.2g)	キク科のアルニカから抽出したもので、炎症や痛みをやわらげます。
l-メントール1.2g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

[添加物] ポリビニルアルコール(部分けん化物)、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースNa、オレイン酸ソルビタン、グリセリン、D-ソルビトール、亜硫酸水素Na、エデト酸Na、チモール、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、乳酸、マクロゴール、アジピン酸ジイソプロピル

■効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

■用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。



■保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は薬袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて密封し、保管してください。(5) 使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 興和株式会社
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先 興和株式会社 お客様相談センター
TEL 03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

セルフメディケーション

税 控除 対象

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

Languages English 简体字 繁體字 한국어

<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>

