

下痢止め薬

トメダイニューフイルム

トメダイニューフイルムは、食べすぎ・飲みすぎによる突然の下痢に、水なしで服用できるフィルムタイプの下痢止め薬です。

- 下痢に対してすぐれた効果を発揮するロペラミド塩酸塩を配合。
- 口の中ですぐに溶け、水なしで服用可能なフィルム剤です。
- 厚さ約0.08mmの薄型フィルム剤なので、財布などに挟んで携帯することができます。
- 突然の下痢に。例えば電車・バスなど乗り物での移動中や、会議中・授業中のトラブルなど、困ったその場で対処することができます。

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

① 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)15歳未満の小児。

② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

④ 服用前後は飲酒しないでください**相談すること****① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師の治療を受けている人。(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。)(4)便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。(本剤の服用により便秘が発現することがあります。)(5)妊婦又は妊娠していると思われる人。(6)授乳中の人。(7)高齢者。(8)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (9)次の症状のある人。口のかわき(本剤が舌の上にとどまらないほど口の中がかわいている状態)

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、腹痛、吐き気、腹部膨満感、便秘、腹部不快感、嘔吐
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
イレウス様症状(腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。

③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気

④2～3日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢

用法・用量

下記の量を口中で溶かして服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。また、下痢が止まれば服用しないでください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1枚	2回
15歳未満の小児	✕服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

①用法・用量を厳守してください。②このお薬(フィルム)は、以下のように服用してください。

①図のようにアルミシートを開け口からゆっくりはがし、お薬(フィルム)だけを取り出してください。(アルミシートごと飲み込まないでください。食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながるおそれがあります。)

②お薬(フィルム)を舌の上にのせ、だ液で溶かしながら服用してください。



③このお薬(フィルム)はすぐに口の中で溶け出しますが、万一、のどにはりついてしまった場合には水で流し込んでください。また、だ液が少なく服用しにくいときは水を口に含み、溶かしながら服用してください。

成分・分量(2枚中)

成分・分量	働き
ロペラミド塩酸塩 1.0mg	腸の過剰な運動や腸の粘膜における水分の吸収・分泌異常を改善して、下痢を抑えます。

[添加物]ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、還元麦芽糖水アメ、マクロゴール、酸化チタン、サッカリンNa、l-メントール、黄色五号、香料、エタノール

保管及び取扱い上の注意

①高温をさげ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)④アルミシートや中身のフィルムが破損しないように、保管及び携帯に注意してください。⑤アルミシート開封後はすみやかに服用してください。⑥使用期限(外箱及びアルミシートに記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어



<https://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>