

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:新キズドライ 殺菌消毒薬 第2類医薬品

特記事項

(1)新キズドライを使用する前に必ず、水道水等のきれいな水で患部の汚れを充分洗い流すこと(十分に洗浄しないで使用すると、患部に汚れが残り化膿する恐れがある)
(2)患部が広範囲にわたるキズや、深いキズ、やけどの場合は、本剤を使用しないこと

(3)重ね塗りをしないこと
(4)同じ箇所に繰り返し使用する場合は、ぬるま湯等で患部をきれいに洗い、付着している薬剤を除去してから使用すること(薬剤の除去が困難になり、治癒を遅らせてしまうことがある)

使い方



①傷口には土や泥等の汚れが付着しています。水道の蛇口を一杯に開いて、きれいに洗い落としてください②出血が多い時はティッシュペーパー等で軽く拭き取ってください

③使用前によく振って、傷口から10cmぐらい離し、缶を正立または倒立の状態で使用してください

効能・効果 きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回、患部に適量を噴射してください

<用法・用量に関連する注意>(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(3)目や口に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ

に水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。また、口に入った場合にはすぐにうがいをし、医師の診療を受けること(4)外用にのみ使用すること(5)使用前によく振ること(6)患部まで約10cmの距離で噴射すること(7)凍傷等の恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと

●「特記事項」の項をよく読むこと

成分・分量 100g中 イソプロピルメチルフェノール0.15g、ジブカイン塩酸塩0.045g、アラントイン0.15g 添加物として、ベンザルコニウム塩化物、ゼラチン、トウモロコシデンプン、白糖、スクワラン、LPGを含有する

使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと(1)患部が広範囲の人、深い傷や出血が多い人、やけどの人(洗浄が充分に行き届かず、化膿したり、治癒が遅れたりする場合があります)

(2)2才以下の乳幼児(皮膚組織の発達が未熟なため、発赤等の炎症をおこす場合があります) 2.次の部位には使用しないこと(1)顔面(2)粘膜(例えば、目、唇、口の中、鼻の穴、耳の中、肛門、性器等)



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬や化粧品、ゼラチン等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、熱感
症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)火気に近づけないこと ●車内や直射日光の当たる場所、暖房器具(ストーブ、ファンヒーター等)の付近等には、温度が上がり破裂する危険があるため置かないこと

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

製品のお問い合わせは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931
MADE IN JAPAN
プラスチック：キャップ、フィルム