



患部に直接
さわらないから

外出先でも
手が汚れない



デリケートゾーンのかゆみ・かぶれに

フェミニーナ

携帯

ミスト

販売名: フェミニーナミスト

かぶれ かゆみ

気になるムレ感にも!
さっぱりした使用感

非ステロイド剤

第2類医薬品

押して開ける

△使用上の注意

**本剤はカンジダ症の治療薬ではありません。フェミニーナ
腔カンジダ錠等カンジダ治療薬と併用しないでください**

×してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.次の人は使用しないこと:カンジダ症の人
2.次の部位には使用しないこと:目の周囲、粘膜等

 **相談すること**

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)湿潤やただれのひどい人(5)乳幼児
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ (右側面につづく)

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとしめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になります。品質が変わること)(●はじめて使用するときは、必ず液が出るまで数回空押ししてください●残量が少なくなった場合、倒立(逆さ)使用では噴霧しにくくなることがあります。その場合には、正立て空噴きすると噴霧できるようになります)

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(箱底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

販売名:フェミニーナミスト
鎮痒消炎薬
Anti-Itch Spray

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫され、皮ふ炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布(噴霧)してください

<用法・用量に関する注意>(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ使用すること●同じ部位に他の外用剤との併用は避けること●患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと●1回2~3噴霧を目安に患部に届くように適量を噴霧すること

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あつたらしいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

成分・分量 100g中 ジブカイン塩酸塩 0.3g、
ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、ベンゼトニウ
ム塩化物 0.1g 添加物として、グリセリン、ベン
ザルコニウム塩化物、エデト酸Naを含有する

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN 10196457