

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

脂質代謝を上げて、
更年期などの脂肪を落とす



第2類医薬品

漢方製剤

販売名：ビスラット ゴールドb

製品特徴

- 1日2回の服用で更年期などの脂肪を落とします
- 脂肪の吸収を抑制し、脂質代謝を活性化します
- 特に便秘がちな方、体脂肪を減らしたい方に適した漢方薬です
- 8種類の生薬からなる大柴胡湯を、服用しやすい錠剤にしました
- 飲み始めるとまずお通じがよくなります

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること

👤 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヶ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：
肥満症、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、胃炎、神経症

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	5錠	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守すること

(2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりしめること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(10錠)中 大柴胡湯エキス(1/2量)… 2.0g

サイコ	3.0g	ハンゲ	2.0g
ショウキョウ	0.5g	オウゴン	1.5g
シャクヤク	1.5g	タイソウ	1.5g
キジツ	1.0g	ダイオウ	0.5g

より抽出

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含む

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること

(2) 小児の手の届かない所に保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

(5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること



イメージ図

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN