

押して
開ける

外用鎮痛
消炎剤

第2類
医薬品

販売名:アンメルツゴールドEX NEO
External Anti-Inflammatory/Analgesic

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しない
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状
を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 15才未満の小児
2. 次の部位には使用しない
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 皮ふの弱い部位(顔、頭、わきの下等)
 - (3) 湿疹、かぶれ、傷口
 - (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤
を使用しない
4. 長期連用しない



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売
者に相談する
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の医薬品の投与を受けている人
ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場
合は副作用の可能性があるので、直ちに使用
を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登
録販売者に相談する

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺 激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカ のような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用后すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
接触皮ふ 炎、光線 過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、 刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮ふ炎症状 や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発 赤、かゆみ等の症状が全身にひろがること がある。また、日光があたった部位に症状が あらわれたり、悪化することがある

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場
合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談する

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

10184333

特 徴

- ① ジクロフェナクが患部に浸
透、痛みを鎮める
- ② 3種の血行促進成分がジン
ジン温かな実感とともに、
滞った患部の血流を改善
- ③ L-メントール5%配合、爽快な
使い心地
- ④ 背中まで届く、ロングボトル

—【成分・分量】100g中—

ジクロフェナクナトリウム 1g
L-メントール 5g
トコフェロール酢酸エステル 100mg
ノナン酸バニリルアミド 12mg
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
添加物として、グリチルレチン酸、
ミリスチン酸イソプロピル、プロ
ピレングリコール、ジプロピレング
リコール、乳酸、エタノールを含む

—【用法・用量】—

1日3~4回、適量を患部に塗布
する。ただし、塗布部位をラップ
フィルム等の通気性の悪いもの
で覆わない。なお、本成分を含む
他の外用剤を併用しない

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守
する(2) 本剤は、痛みやはれ等
の原因となっている病気を治療
するのではなく、痛みやはれ等
の症状のみを治療する薬剤な
ので、症状がある場合だけ使用
する(3) 本剤は外用にのみ使用
し、内服しない(4) 1週間あたり
50gを超えて使用しない(5) 目
に入らないように注意する。万
一、目に入った場合には、すぐ
に水又はぬるま湯で洗う。なお、症
状が重い場合には、眼科医の診
療を受ける(6) 使用部位に他の
外用剤を併用しない(7) 通気性
の悪いもの(ラップフィルム、矯
正ベルト等)で使用部位を覆い、
密封状態にしない
- 皮ふの特に弱い方は、同じ所
に続けて使用しない
- スポーツや入浴等、汗をかく
前・後に使用した場合、ヒリヒリ
とした刺激、痛みや熱感が増す
ことがあります。これらの症状
が強い場合は、石けんで洗い流
すと緩和します

あつたら
いいな
をカタチにする
小林製薬

使用に際して、この説明書
きを必ず読むこと。また
必要なときに読めるよう
大切に保管すること

—【効能・効果】—

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関
節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の
痛み)、肘の痛み(テニス肘な
ど)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所(冷暗所)
にキャップをしっかりとめて
箱に入れて立てて保管する
- (2) 火気に近づけない
- (3) 小児の手の届かない所に保
管する
- (4) 他の容器に入れ替えない
(誤用の原因になったり品
質が変わる)
- (5) 使用期限をすぎた製品は使
用しない。なお、使用期限内
であっても、開封後はなる
べく速やかに使用する
- キャップをしっかりとめない
と液がもれることがある
- 衣類に付着した場合には、各
衣類の洗濯表示に従って、す
みやかに洗う

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお問い合わせください

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税 控除 対象

MADE IN JAPAN

ロングボトル

小林製薬

背中まで
届く!

肩こりの痛みに

アンメルツ
ゴールドEX NEO

ジクロフェナクNa
+ 血行促進成分

ロング

ロングボトル

無臭性

イメージ図

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛

第2類医薬品