

# アルコール

などによる

# 頭痛に



# アスピタン

アルコールによる脳のむくみを抑える

**食事の前に**

または食間に

頭痛、二日酔のときにも

頭痛、二日酔



小林製薬

第2類医薬品

顆粒

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

**【用法・用量】** 大人(15才以上)1回1包、7才以上15才未満1回2/3包、4才以上7才未満1回1/2包、2才以上4才未満1回1/3包、1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(2才未満は服用しないこと)  
**〈用法・用量に関連する注意〉** (1)定められた用法・用量を厳守すること (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること ●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

**【成分・分量】** 1日量(3包:4.5g)中 五苓散エキス……2.3g  
〔タクシャ…5.0g、チョレイ…3.0g、ブクリョウ…3.0g、ビャクジュツ…3.0g、ケイヒ…2.0g より抽出〕  
添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

押して開ける

販売名：アルピタン

第2類医薬品

Medicine for Hangover and Headache

**△使用上の注意**  **相談すること**

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、次の症状が

あらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位(急性胃腸炎、二日酔いに服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】**

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹注)のものには使用しないこと、暑気あたり、むくみ、頭痛、二日酔注)「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を2回以上折り返して保管すること。また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

小林製薬 お客様相談室

**0120-5884-01**

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

漢方製剤

10199603

特 徴

- アルコールなどによる頭痛、二日酔いに効く漢方処方“五苓散”です。
- アルコールの分解促進と、体内の水分バランス調整により、つらい頭痛や二日酔を抑えます。
- 素早く溶ける顆粒タイプです。



副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

あつたら  
いいな  
をカタチにする

小林製薬