

背中・デコルテ などの ブツブツ治療薬

セナキュア

メディカルスプレー



くりかえしやすい
ブツブツ
デコルテにも!
ニキビに効く

- ✓ 原因菌を殺菌
- ✓ 赤み改善
- ✓ 組織修復

すべすべ素肌へ!

にきび

第2類医薬品



販売名:セナキュア 第2類医薬品
にきび治療薬 Acne Remedy

特徴

くりかえしやすい背中のブツブツの原因菌を殺菌し、きれいな素肌へ改善していきます

殺菌作用

角質をやわらかくし、毛穴のつまりを除去くりかえすブツブツの原因菌を殺菌します

赤み改善作用

目立って気になる赤み・炎症をしずめます

組織修復作用

なめらかな素肌へと改善します

逆さにしてでも使える!



- 1日2回(朝・晩)の使用がオススメ
- 低刺激処方を使い心地しっとり
- 広範囲に広がりやすいスプレー

効能・効果 にきび

用法・用量 1日2回(朝・晩)、適量を患部に塗布する

<用法・用量に関連する注意>


(1)使用前に腕の内側等に少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をさけること(2)用法・用量を厳守すること(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(4)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(5)外用にのみ使用すること

成分・分量 100g中

サリチル酸……………0.5g
エタノール……………22.84g
アラントイン……………0.2g
添加物として、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベン、エデト酸Na、pH調節剤を含有する

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと: 目や目の周囲

 **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 深い傷やひどいやけどの人 (6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. その他 (1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止すること (2) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止すること。再び使用するときには間隔をあけて使用すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN 10189741

押して
開ける

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(箱裏面及び容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください(材質によっては落ちにくいことや変色・変質することがある) ●残量が少なくなった場合、倒立(逆さ)使用では噴霧しにくくなる場合があります。その場合には、正立で空噴きすると噴霧できるようになります

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

第2石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性

火気厳禁