

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面及びチューブ底に記載）を過ぎた製品は使用しないこと

第2類医薬品

販売名：ミーミエイド

外用皮ふ・湿疹用薬

ミーミエイド

特徴

1. 耳の裏や耳たぶなど耳まわりのかぶれや荒れを繰り返している人のための医薬品です
2. 抗炎症成分と抗ヒスタミン成分が赤みとかゆみを鎮めていきます
3. 殺菌成分が耳まわりの肌トラブルの原因菌を殺菌します
4. つらい耳まわりの繰り返す症状を改善します
5. 肌にやさしくなじむ、べたつかないクリームです

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------------------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感 |

3. 1～2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、おむつかぶれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 患部を清潔にした後、塗布すること

成分・分量 100g 中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|---------------|------|------------------------------------|
| ウフェナマート | 5.0g | 非ステロイド性の抗炎症成分で、患部に直接作用し、赤み・炎症を鎮めます |
| ジフェンヒドラミン | 1.0g | 抗ヒスタミン成分で、かゆみの発生を抑えます |
| グリチルレチン酸 | 0.3g | 抗炎症成分で、赤み・炎症を鎮めます |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.5g | ビタミンE成分で、血行を促進して肌の新陳代謝を助けます |
| ベンゼトニウム塩化物 | 0.1g | 殺菌成分で、雑菌の発生を抑えます |

添加物として、ワセリン、ステアリルアルコール、セタノール、ステアリン酸グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、ベヘニルアルコール、セトマクロゴール、ジメチルポリシロキサン、パラベン、BHTを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10187477