

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及びチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと



販売名：フェミニーナUP

第2類医薬品 外用皮ふ・湿疹用薬

⚠ 使用上の注意

本剤はカンジダ症の治療薬ではありません。フェミニーナ腔カンジダ錠等カンジダ治療薬と併用しないでください

- ⓧ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと: カンジダ症の人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3. 1~2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

皮ふ炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、おむつかぶれ、ただれ、あせも

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 患部を清潔にした後、塗布すること

成分・分量 100g中

成 分	分 量	はたらき
ウフェナマート	5.0g	(抗炎症成分) 非ステロイド性の抗炎症成分で、患部に直接作用し、赤み・炎症を鎮めます
リドカイン	1.0g	(局所麻酔成分) かゆみ・痛みを素早く鎮めます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.0g	(抗ヒスタミン作用) かゆみを鎮めます
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	(ビタミン成分) 血行を促進して肌の新陳代謝を助けます

添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、ステアリン酸、ワセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸グリセリン、グリセリン、パラベンを含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

腔内、腔入り口、尿道付近等粘膜部位への使用はおやめください。粘膜部分がかゆい場合やおりものに異常を伴う場合は、腔カンジダ等の可能性も考えられますので、病院を受診することをお勧めします

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 福地製薬株式会社
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

MADE IN JAPAN

10185923