

ぶり返す

目のまわりにも使える

顔乾燥 荒れ

などの



目のまわりにも使える 乾燥荒れ治療薬

キュアレア ドライ

イメージ図

粉ふき ヒリヒリ バリア機能低下

非ステロイド

密着してなじみやすい



クリーム

※ セラミド+

ヘパリン類似物質 配合

かゆみ止め×肌バリア修復成分 配合 +

販売名: キュアレアドライ

第2類医薬品



小林製薬 乾皮症、小児の乾燥性皮膚※セラミド様成分(湿潤剤)配合

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

MADE IN JAPAN

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室


0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

使用に際して、この説明書きを必ずお読み
ください。また必要なときに読めるよう
大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



販売名:キュアレアドライ
外皮用薬 **第2類医薬品**
Medicine for Dry Skin

効能・効果 手指の荒れ、ひじ・
ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび
・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しも
やけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの
皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・
ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1~数回、適量を患部に
すりこむか、又はガーゼなどにのばして貼
ってください

<用法・用量に関連する注意>(1)小児に使用させる場合
には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目
に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ
に水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ使用すること

成分・分量 100g中
ヘパリン類似物質 0.3g、ジフェンヒドラ
ミン 0.5g、ガンマ-オリザノール 1.0g
添加物として、ワセリン、スクワラン、流動パ
ラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチ
ルポリシロキサン、1,3-ブチレングリコ
ール、プロピレングリコール、2-メタクリロイル
オキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸
ブチル共重合体液、N-(ヘキサデシロキシヒ
ドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘ
キサデカナミド※、セタノール、ステアリルア
ルコール、ポリソルベート60、自己乳化型ス
テアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エ
デト酸Na、パラベン、2,2',2"-ニトリロトリエ
タノール、pH調節剤を含有する

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し
て保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品
質が変わる)(4)火気に近づけないこと●衣類に付着する
と、まれに黄ばみを生じることがあるので注意すること

あたら
しいな
をカタチにする

小林製薬

10211355

⚠ 使用上の注意 **⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は使用しないこと(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病等)の人(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)(3)アトピー性皮膚炎の人(軽い症状であっても医師の下で適切な治療を受ける必要がある) **👉 相談すること** **1.** 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)湿潤やただれのひどい人(4)医師からアトピー性皮膚炎と診断されたことのある人 **2.** 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること **3.** 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

押して開ける