

満量処方

ひきはじめの
風邪に



眠くなる成分は
入っていません

葛根湯 エキス顆粒

かつこんとう

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入しておりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

【販売名】 阪本漢法の葛根湯エキス顆粒

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】

1日3回食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	1包
7歳以上 15歳未満	2/3包
4歳以上 7歳未満	1/2包
2歳以上 4歳未満	1/3包
2歳未満	1/4包

*食間とは食後2～3時間を指します。

*微温湯又は水で服用してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】 成人1日量3包(1包3.0g)中
日局 葛根湯エキス 4.34g

成分	分量	成分	分量
日局 カッコン	8.0g	日局 シャクヤク	3.0g
日局 マオウ	4.0g	日局 カンゾウ	2.0g
日局 タイソウ	4.0g	日局 ショウキョウ	1.0g
日局 ケイヒ	3.0g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いているので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

開封口

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | ⋮ (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | ⋮ (8) 次の症状のある人。 |
| (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人)。 | ⋮ (9) 次の診断を受けた人。 |
| (4) 胃腸の弱い人。 | ⋮ 高血圧、心臓病、腎臓病、 |
| (5) 発汗傾向の著しい人。 | ⋮ 甲状腺機能障害 |
| (6) 高齢者。 | ⋮ |

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

満量
処方

ひきはじめての
風邪に



眠くなる成分は
入っていません

葛
根
湯

エキス顆粒

かっこんとう

第2類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月~金曜日10:00~17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931