

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

ペラックスイート ブルーベリーS

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人: 高熱
- (7) 次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 12粒中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム 135.0mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 6.0mg
添加物: グリセリン脂肪酸エステル、イソマル、I-メントール、赤色106号、
青色1号、香料、エタノール、プロピレンジコール

用法・用量

成人(15歳以上) 及び 8歳以上	1回2粒	1日5~6回 口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用して下さい。
5歳以上8歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関する注意〉 (1) 用法・用量を厳守して下さい。 (2) 5歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

第2類
医薬品

●お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社
お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

のどの痛み・せき・たん ペラックスイート ブルーベリーS

第2類医薬品

のど

のどの炎症による声がれ、
のどの不快感

力口リーと虫歯が気になる方に

甘さすっきりシュガーレス



第一三共ヘルスケア

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>
製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10

B2 ®登録商標
MADE IN JAPAN

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になつたり品質が変わります)
- (4) スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、せき、たん、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうさせき