



貼る



かゆみどめ

マキロン[®]パッチエース

[抗炎症成分配合]

赤くはれた

虫さされのかゆみを
鎮める



第2類
医薬品



第一三共ヘルスケア

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02[®]登録商標

鎮痒消炎薬

マキロンパッチエース

開封口

第2類医薬品

[効能・効果]

虫さされによるかゆみ

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。

⚠️ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 (2) 目の周囲、粘膜等 (3) 傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。

👤 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[成分・分量] 本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物:アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール

副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

[**使用法**] 1日1~3回患部に貼って下さい。〈**使用法に関連する注意**〉(1)使用法を厳守して下さい。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(3)外用にのみ使用して下さい。(4)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5)数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6)同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

[**保管及び取扱い上の注意**] (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4)品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。 [**包装**] 直径2.0cm

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7

MADE IN JAPAN