

第2類**医薬品**

1回1包・1日2回服用

販売名：ラックル顆粒

痛みを緩和、肩・腕の動きを回復

# 五十肩 四十肩に**肩用ラックル<sup>®</sup>顆粒**

天然生薬100%の漢方薬

## 特長

1. 五十肩の痛みを緩和し、肩・腕の動きを回復させる顆粒の飲み薬です。
2. 五十肩を体の中から改善し、腕を上げられるようになります。
3. 天然生薬 100%の漢方薬です。
4. 肩の血流を促進し、ポカポカ暖める作用があります。
5. 9種の生薬から抽出した有効成分を最大量配合した満量処方です。
6. 1回1包・1日2回の飲み方です。
7. 眠くなる成分を配合していません。

## 用法・用量

成人（15歳以上）1回1包を1日2回朝夕、食前又は食間に水かお湯と一緒に服用して下さい。又はお湯に溶かしてかき混ぜてから服用して下さい。1カ月間毎日飲んで効果がなければ服用を中止して下さい。

15歳未満7歳以上1回2/3包、7歳未満4歳以上1回1/2包、4歳未満2歳以上1回1/3包、いずれも1日2回朝夕、食前又は食間に服用して下さい。

## 用法・用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

使用  
期限  
製造  
番号

## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：  
五十肩・四十肩・肩こり・寝ちがえ

販売 **日本臓器製薬株式会社**  
大阪府中央区平野町2-1-2

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**  
奈良県高市郡高取町清水谷1269

日本臓器製薬 お客様相談窓口 ☎06-6222-0441  
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## ⚠️ 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ・排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧・心臓病・腎臓病・甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 1日量2包 5.4g 中 独活葛根湯乾燥エキス 4.8g

ドクカツ…2.0g、シャクヤク…3.0g、カンゾウ…1.0g、カクコン…5.0g、ジオウ…4.0g、ケイヒ…3.0g、マオウ…2.0g、ショウキョウ…0.5g、タイソウ…1.0g等、9種の生薬から抽出した有効成分4.8gを全て配合した満量処方と呼ばれる分量です。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。