

かぜのひきはじめ  
に効く漢方薬成分の

か っ こ ん と う

葛根湯

熱・のどの痛み  
せきに効く

そ う ご う

ぐ す り



総合かぜ薬

成分を

ひとつにしたかぜ薬

# ココト<sup>®</sup>顆粒

ふたつのかぜ薬成分でかぜに効く



ビタミンC

ビタミンB<sub>2</sub>配合

第②類医薬品

**コフト® 顆粒****特長**

1. **かぜのひきはじめに効く漢方薬成分の葛根湯と熱・のどの痛み・せきに効く総合かぜ薬成分をひとつにした顆粒のかぜ薬です**
2. 漢方薬の葛根湯と総合かぜ薬のふたつのかぜ薬成分の作用で、かぜに効きます
3. 配合の総合かぜ薬は頭痛・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・関節の痛み等といった、かぜの諸症状に効きます
4. 12歳以上のお子様から大人まで服用できます
5. レモン25個分のビタミンC・ビタミンB<sub>2</sub>配合

**効能・効果**

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

**用法・用量**

15歳以上の**成人1回1包**、12歳以上15歳未満1回2/3包、いずれも**1日3回**、食後なるべく30分以内に、水と一緒に服用して下さい 12歳未満は服用しないで下さい  
残った顆粒を保管する場合、顆粒がこぼれ出ないようにアルミ袋の開け口を3重に折り曲げ、2日以内に服用して下さい

**用法及び用量に関連する注意**

(1) 用法・用量を厳守して下さい (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい

販売

**日本臓器製薬**

大阪市中央区平野町2丁目1番2号

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441  
土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元

**新生薬品工業株式会社**

奈良県高市郡高取町清水谷1269

副作用被害救済制度

☎0120・149・931

®登録商標

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい

**成分 3包中**

**漢方薬葛根湯の生薬成分と作用** 葛根湯エキス2,200mg中 カッコン…3.83g  
マオウ…1.91g タイソウ…1.91g ケイヒ…1.43g シャクヤク…1.43g カン  
ゾウ…0.96g ショウキョウ…0.48g 7種類の生薬成分が、かぜのひきはじめに  
効果を発揮します

**総合かぜ薬の成分と作用** アセトアミノフェン…450mg 熱を下げ、のどの痛  
み・頭痛を治します クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg 鼻水・鼻づま  
り・くしゃみを抑えます ジヒドロコデインリン酸塩…24mg せき中枢に働きせ  
きを止めます ビタミンC…500mg レモン25個分のビタミンCを含みます ビ  
タミンB<sub>2</sub>…4mg 卵・牛乳に含まれる栄養成分です グアイフェネシン…250mg  
たんを出しやすくします 無水カフェイン…90mg のどの痛み・頭痛を治す作用  
を高める効果があります

添加物 乳糖水和物・ヒドロキシプロピルセルロース・スクラロース・香料

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に  
保管して下さい (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい (3) 誤用の原因  
になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下  
さい (4) 使用期限を過ぎた商品は服用しないで下さい

## ▲使用上の注意

❌**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人 (3) 12歳未満の小児
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、眠気等があらわれることがありますので、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい
- 服用前後は飲酒しないで下さい
- 長期連用しないで下さい

## ■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 高熱、排尿困難の症状のある人 (6) 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

【右側面に続きが記載されています】

## ■相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります  
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮ふ上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりクラツとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

- 服用後、便秘、口のかわき、眠気等があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
- 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい