

腰などの痛みに直接浸透!

フェイタス[®]5.0 大判サイズ

フェルビナク配合テープ剤

商品の特長

- 効きめ成分フェルビナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
- 肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
- ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
- L-メントール3.5%配合で、さわやかな清涼感です。
- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。
- 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。
- 保存に便利なチャック付きです。

⚠ [使用上の注意]**⊗ してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】 表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
フェルビナク	5.0g
l-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	2.3g


添加物として、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。
- (5) 使用期限(この箱及び薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

〈包装〉10cm×14cm …………… 10枚入、20枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：☎0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)