

薄い・密着、はがれにくい

のびのびサロンシップ[®] EX

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

商品の特長

- インドメタシン1.0%とℓ-メントール1.2%のダブル鎮痛処方
- こちょよい冷感の〈微香性〉鎮痛消炎冷感シップ剤。
- 薄く軽いので、使用部位にしっかり密着。
- シップの角を丸くする事で衣類に引っかからず、はがれにくくなりました。
- 伸縮自在で、関節部位にもぴったりフィット。
- フィルムがはがしやすく、貼りやすいシップです。
- 1枚ずつ取り出しやすく、コンパクトな包材の「ポケシップ[®]」です。



⚠️ [使用上の注意]

❌ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人には使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 腰痛、関節痛（五十肩など）、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲（うちみ）、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】 ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
インドメタシン	1.0g
ℓ-メントール	1.2g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、オレイン酸ソルビタン、グリセリン、ケイ酸Al、ゼラチン、D-ソルビトール、パラベン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

《包 装》 10cm × 14cm …………… 10枚入、20枚入

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <https://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9：00－17：50（土日・祝日・会社休日を除く）