

飲みやすい錠剤

胃酸に速攻

(速効性制酸剤配合)

パンシロン<sup>®</sup>

キュア

胃痛・胃酸逆流  
などによる胸やけに

食前の空腹時にも、食後にも飲める



1回2錠

飲みやすい

錠剤タイプ

ロート製薬

第2類医薬品

〈販売名〉パンシロンキュアSP錠



お客さま安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。  
東京:03-5442-6020  
大阪:06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)



パウチでエコ

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりとしめること

胃腸薬

**【効能・効果】**胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)

### ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1.次の人は服用しないこと(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)透析療法を受けている人
- 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと:胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
- 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある) 4.長期連用しないこと

### 🗣 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)授乳中の人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:排尿困難 (6)次の診断を受けた人:緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便秘、下痢、口のかわき
- 4.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【用法・用量】** 次の1回量を1日3回食前または食後に、水又はお湯で服用すること。

15才以上…1回2錠、15才未満…服用しないこと <用法・用量に関連する注意>用法・用量を厳守すること。**【成分・分量】**(6錠中)水酸化マグネシウム 450mg、合成ヒドロタルサイト 780mg、沈降炭酸カルシウム 900mg、アルジオキサ 150mg、ピレンゼピン塩酸塩水和物 46.9mg、炭酸水素ナトリウム 240mg、チンピ末 300mg。添加物として、L-アルギニン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、ℓ-メントール、香料を含む。**【保管及び取扱上の注意】**(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5)まれに錠剤に黒い点がみられるが品質には問題ない。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

**オーロ製薬株式会社** 大阪市生野区巽西1-8-1  
お客さま安心サポートデスク: 06-6758-1230