



ハレス®

塗る 歯槽膿漏薬

歯槽膿漏による歯ぐきのはれ・出血に 口内炎にも

歯を失う原因となる、歯槽膿漏に挑む。

～歯をしっかり支える本来の強い歯ぐきのために～

「ハレス®口内薬」は弱った歯ぐきで起こる
歯槽膿漏症状を抑えます。

歯を失わないことを目指し、本来の強い歯ぐきへ
再活サポートしていく歯ぐきのための医薬品です。

独自の歯ぐき再活サポート処方

有効成分が患部に働いて、
歯ぐきを修復(活性化)し、
歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状を緩和します

歯ぐき細胞を活性化して、
弱った組織を修復していきます

歯ぐきの組織修復
アラントイン

はれ、痛み等の
症状を鎮めます

抗炎症
グリチルリチン酸
二カリウム

歯ぐきの組織
修復を促します

血行促進
ビタミンE
誘導体*

歯ぐきに
浸透して効く

殺菌
CPC**
ヒノキチオール

歯周ポケットに潜む
細菌の増殖を抑えます

ハッカ油、*l*-メントール配合
(清涼化剤)

止血作用
カルバゾクロム

歯ぐきの毛細血管を
強化し、出血を抑えます

* トコフェロール酢酸エステル ** セチルピリジニウム塩化物水和物

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

●販売名 ハレス®口内薬

歯肉炎・歯槽膿漏薬

第3類医薬品



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- しばらく使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚・口内	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

●効能・効果
歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

●用法・用量
・歯肉炎・歯槽膿漏: 1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g/約3cm)を歯ぐきに塗り込んでください。
・口内炎: 1日2~4回、適量を患部に塗ってください。

[用法・用量に関連する注意]

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 歯科用にのみ使用してください。

ご使用方法(歯肉炎・歯槽膿漏)

- まず、歯磨きをして口の中を清潔にします
- 指に、本剤を適量(約0.3g/約3cm)のせませす
- 口を開いて、歯ぐきに本剤をやさしく塗り込んでください

歯ぐき全体に指でマッサージしながら塗り込むと効果的です

マイルドミントの爽やかな使用感



患部にしっかり留まる、
ポリマー配合の密着ジェル

●成分・分量(100g中)
アラントイン 0.3g、トコフェロール酢酸エステル 2.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.4g、カルバゾクロム 0.02g、ヒノキチオール 0.1g、セチルピリジニウム塩化物水和物 0.05g
添加物として、ワセリン、流動パラフィン、無水ケイ酸、サラシミツロウ、CMC-Na、マイクロクリスタリンワックス、カルボキシビニルポリマー、ポリエチレン、ハッカ油、*l*-メントール、チモール、エデト酸Na、香料、赤色3号を含有する。
※製剤中に見られる赤い点は成分によるもので、品質に影響ありません。

●保管及び取扱い上の注意
1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
4. 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230 受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1