

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。 眼科用薬

販売名：ロートアルガードクリニカルショット

ロート アルガード®クリニカルショット

【アレルギー症状が続き、かつ炎症を伴う方におすすめします】

第2類医薬品

製品の特徴

目のかゆみはもちろん、充血、異物感、これらすべてのアレルギー症状に効く！
アルガード史上、最強*の処方設計！クリニカル処方！

*従来の一般用アレルギー用点眼剤を2日間位使用し、十分な効果が得られなかった方におすすめします。


クリニカルの全有効成分 最大濃度配合* ※既承認一般用眼科用薬中(令和元年5月現在)

抗アレルギー成分



イメージ図
細胞膜を破れにくくすることでアレルギーの発生(ヒスタミン等の放出)を原因から抑えます。

抗ヒスタミン成分



イメージ図
ヒスタミン(アレルギー原因物質)をブロックし、かゆみを抑えます。

抗炎症成分



イメージ図
炎症を起こす原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑制し、炎症を鎮めます。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1 次の人は使用しないこと。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 7才未満の小児(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人(4) 授乳中の人

相談すること



1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人。(4) アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児。(5) 次の症状のある人：はげしい目の痛み、強い異物感(6) 次の診断を受けた人：緑内障(7) 眼球乾燥症候群(ドライアイ)の診断を受けた人又はその恐れがある人。(8) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるので、使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- 片方の目だけに症状がある場合 ●目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- 視力が低下した場合 ●目やにの多い場合

2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ*、はれ*、刺激感・しみる*、異物感、なみだ目、目やに、痛み*
その他	息苦しさ

*目のまわりを含む



3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 症状が悪化した場合
- (2) 目のかすみが改善されない場合(緑内障等の可能性も考えられる)
- (3) 3日位使用しても症状がよくなる場合

4 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

成人(15才以上)及び7才以上の小児:1回1~2滴、1日4回(朝、昼、夕方、就寝前)点眼する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとること。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。
- (4) コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
(一旦レンズを外してから点眼すること。)
- (5) 点眼用のみ使用すること。
- (6) 用法・用量を厳守すること。



成分・分量

有効成分	配合量
トラニラスト	0.5%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%
プラノプロフェン	0.05%
タウリン	1.0%

添加物として、ホウ酸、ポビドン、ポリソルベート80、モノエタノールアミン、メントール、d-ボルネオール、ユーカリ油、BHT、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
※冷蔵庫での保管は避けること。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないこと。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないこと。



お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

000000000