


折りたたんで廃棄し
やすいボトルを採用

省資源・ゴミ削減のため、減容
後の容積は約 $\frac{1}{4}$ になります。

- ①折り目に沿ってつぶしてください。
- ②空気が入らないよう、キャップをしめてください。



P

殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方

消毒用エタノール

アルコール類 * 水溶性 * 危険等級II * 火気厳禁

Ethanol for Disinfection
(消毒用アルコール)

 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

殺菌・消毒に

折り目

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくな
ります)

次の部位には使用しないでください
粘膜（口唇等）、目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく
ださい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、 はれ、灼熱感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない
場合は使用を中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

【効能効果】 創傷面の殺菌・消毒

【用法用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽
く塗ってください。

(右側面へ続く↗)

(↗左側面より続く)

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、
ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでくだ
さい。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こす
ことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に
注意してください。

- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のも
とに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に
入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってく
ださい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療
を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】
エタノール (C_2H_5O) 76.9~81.4 vol%を含有します。
【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して
ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因
になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださ
ないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。
(変質又は変色のおそれがあります。)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

400

300

200

100