



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2012年5月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬
滋養強壯

エンケル スター

エンケルスターは紅参、何首烏、イカリソウなど
20種類の生薬にビタミン、タウリンなどを配合
したドリンクです。

滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給にすぐれた効
果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登
録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、こ
の文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

- 滋養強壯
- 肉体疲労・病中病後・発熱性消耗性疾患・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給
- 虚弱体質

【用法・用量】

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1瓶(50mL)	1回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量と働き】1瓶(50mL)中

成 分	分 量	働 き	それぞれの生薬 から抽出された もので、滋養強壯、 肉体疲労時の栄 養補給、発熱性 消耗性疾患時の 栄養補給に効果 があります。
紅参(コウジン)流エキス	1,500mg	オタネニンシンの根	
イカリソウ流エキス	1,000mg	イカリソウの全草	
反鼻(ハンピ)チンキ	100mg	マムシの皮と内臓を除い て乾燥させたもの	
何首烏(カシュウ)エキス-A	40mg	ツルドクダミの塊根	
ガラナエキス	150mg	ガラナの種子	
山薬(サンヤク)流エキス	300mg	ナガイモの塊茎	
枸杞子(クコシ)流エキス	300mg	クコの果実	
山楂子(サンザシ)エキス	30mg	サンザシの果実	
地黄(ジオウ)乾燥エキス	120mg	アカヤジオウの根	
五味子(ゴミシ)流エキス	300mg	チョウセンゴミシの果実	

★裏面につづく

成分	分量	働き
山茱萸(サンシュユ)流エキス	200mg	サンシュユの果肉
杜仲(トチュウ)流エキス	300mg	トチュウの樹皮
菟糸子(トシシ)流エキス	300mg	ネナシカズラの種子
茯苓(フクリョウ)エキス-N	10mg	マツホトの菌核
当帰(トウキ)エキス	60mg	トウキの根
麦門冬(バクモンドウ)エキス	250mg	ジャノヒゲの肥大根
遠志(オンジ)エキス	30mg	イトヒメハギの根
甘草(カンゾウ)流エキス	600mg	カンゾウの根
黄耆(オウギ)流エキス	300mg	キバナオウギの根
ローヤルゼリー	150mg	ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、滋養強壮に効果をあらわします。
タウリン	1,000mg	アミノ酸の一種で、滋養強壮に効果をあらわします。
ビタミンB ₆	10mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給、発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。
ビタミンE酢酸エステル	10mg	
ニコチン酸アミド	40mg	

それぞれの生薬から抽出されたもので、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給、発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果があります。

添加物として、安息香酸Na、*dl*-リンゴ酸、白糖、ハチミツ、リンゴ果汁、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、カラメル、pH調整剤、香料(グリセリン、プロピレングリコール、バニリンを含む)、アルコール(1.5mL以下)を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります。



●紅参

オタネニンジン(朝鮮人参)の根を蒸した後、乾燥したものです。サポニンを主成分とし、滋養強壮、虚弱体質に効果をあらわします。



●イカリソウ

イカリソウの全草を薬用とします。イカリソウは別名淫羊藿(インヨウカク)ともよばれ、滋養強壮に効果をあらわします。



●何首烏

タデ科ツルドクダミの塊根から抽出したものです。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



●ガラナ

ガラナの種子を粉にしてくん煙乾燥したものです。サポニン、タンニン、カフェインなどを含み、滋養強壮に効果をあらわします。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

ストローの添付を終了させていただきました。
(そのまま服用されても効果は変わりません。)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号