

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬

エンケル。黄帝ロイヤルスレミアム

ユンケル黄帝ロイヤルプレミアムは、エレウテロコック、チンピ、モクテンリョウなどの 14 種類の生薬にビタミンなどを配合したドリンクです。 滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給にすぐれた効果をあらわします。

使用上の注意

■ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又 は登録販売者にご相談ください

関係部位		症	状	
皮	膚	発疹・発赤、	かゆみ	

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕

- ○滋養強壮
- ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・ 妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕-

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本 (50mL)	1 🗆
15歳未満	服用しない	でください

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕1本(50mL)中-

成 分	分 量	働	<u>*</u>
イカリソウエキス	200mg	イカリソウの地上部	
エレウテロコック流エキス	500mg	エゾウコギの根茎	V 10 V*10 00 H = ====
オウギ流エキス	300mg	キバナオウギなどの根	それぞれの生薬 から抽出された
ゴミシ流エキス	300mg	チョウセンゴミシの果実	もので、滋養強
ジオウ流エキス	0.15mL	アカヤジオウなどの根	壮、肉体疲労時
タイソウエキス	120mg	ナツメの果実	の栄養補給、発
チンピエキス	20mg	ウンシュウミカンなどの成熟した果皮	熱性消耗性疾患
トウキエキス	60mg	トウキ、ホッカイトウキの根	時の栄養補給に効果があります。
ニンジン流エキス	1000mg	オタネニンジンの根	7717/75 45 5 67 9 6
バクモンドウエキス	250mg	ジャノヒゲの肥大根	



成 分	分 量	働	き
モクテンリョウ流エキス	30µL	マタタビの子房にマタタ ビアブラムシなどが寄生 した虫えいを蒸したもの	
ハンピチンキ	200mg	マムシの皮と内臓を 除いたもの	壮、肉体疲労時の栄養補給、発
ビャクジュツエキス	53.5mg	オケラ、オオバナオケラ の根茎	熱性消耗性疾患時の栄養補給に
ブクリョウエキス	10mg	マツホドの菌核	効果があります。
ビタミンB2 リン酸エステル	10mg	で淡美部 小が美語 小が表出 小が表 小が表	
ビタミンB6	10mg		
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミン E)	10mg		
γ-オリザノール	10mg	自律神経に働いて効果	をあらわします。
無水力フェイン	50mg	中枢神経に働いて効果	をあらわします。

添加物として、白糖、ハチミツ、リンゴ果汁、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、pH調節剤、香料(バニリン、エチルバニリン、グリセリン、プロピレングリコールを含む)、アルコール(1.5mL以下)を含有します。



イカリソウ



●エレウテロコック

エゾウコギの根茎を 薬用とします。主成分 はエレウテロシドで 滋養強壮、虚弱体質に すぐれた効果があり ます。



モクテンリョウ

マタビアラムを落とを落したで、海とかり、一次ではいる。

〈成分・分量に関連する注意〉

- ○本剤はビタミンB2リン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- ○本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、 お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03-5412-7393

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

