

インドメタシンが

痛みに

直接効く

インドメタシン
3.75%配合

腰痛・関節痛
肩こり

(肩こりに伴う肩の痛み)

インドメタシンと
L-メントールの **W** の効果

目立ちにくい肌色

全方向伸縮自在

オムニード **ID**
ブラスター 3.75M

1枚:7×10cm

第2類医薬品

PHARMACARE
ファルマケア

ここを押して
開けて下さい。

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要なときに読
めるよう大切に保管してください。

販売名：オムニードIDプラスター3.75M

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を
起こしたことがある人。

(2) ぜんそくを起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜等。

(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売 者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可 能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持っ て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、 ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は 使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は 登録販売者に相談すること

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回
を限度として患部に貼付する。

●11歳未満の小児は使用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 11歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに使用させること。

(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療
するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する
薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。

(4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭きとっ
てから使用すること。

(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇
所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、
発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないこと
を確かめてから使用すること。

(6) 皮膚の特に弱い人は、本剤を同じ箇所には続けて貼らないこと。

(7) 連続して2週間以上使用しないこと。

【成分・分量】 膏体100g(1m²)中

インドメタシン……………3.75g

l-メントール……………3.0g

添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、
ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他1成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管
すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋
に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管する
こと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電 話 (0879) 25-2363

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発 売 元 ティコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元 帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地