

※ 2012年10月改訂(第5版:記載要領改正による改訂等)

※ 2011年 6月改訂(第4版)

貯 法	室温保存、火気厳禁
使用期限	外箱の使用期限内に使用すること


日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21400APZ00762000
承認年月	2002年11月11日
販売開始	2002年11月15日


ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用消毒剤 第3類医薬品
ポケットコール

【特徴】

70vol%イソプロパノールを不織布に含浸し、一回使用分ずつ包装したアルコール綿です。

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。
粘膜、創傷面および目のまわり



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬や化粧品によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ等)を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 深い傷やひどい火傷の人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

1. 皮膚に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがあります。
2. 本品は、アルコールのみによる殺菌作用を目的としており、すべての細菌やウイルスに効果があるものではありません。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

【用法・用量】

そのまま、患部を塗擦して用いる。

(用法・用量に関連する注意)

- 1) 外用にのみ使用してください。
- 2) 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- 3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- 4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- 5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 6) アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部まで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用してください。

【成分・分量】

本液100mL中に下記の成分を含む。

有効成分: 日局イソプロパノール 70mL
溶 剤: 日局精製水 30mL
液 量 : 1.2mL
担 体 : 不織布 1枚(サイズ7cm×3.5cm)

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管してください。
- 2) 火気に近づけないでください。
- 3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 4) 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理してください。
- 5) 誤用や品質の低下を避けるため、再使用や他の容器に移し替えをしないでください。
- 6) 本品は、小売りでの開封小分け販売はできません。

※ 火気厳禁

【包装】

60包入・150包入

【消費者相談窓口】

発売元 白十字株式会社
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12
お客様相談室 ☎0120-01-8910
受付時間/9:00~17:00(月~金※祝日を除く)
(休日・夜間 TEL. 03-3987-6111)

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 リバテープ製薬株式会社
〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野45番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)